Moa

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Moaerne er en gruppe af uddøde fugle, der levede på New Zealand indtil omkring 1500-tallet. Ligesom de nulevende strudsefugle kunne moaerne ikke flyve. Man kender cirka 10 arter, der blandt andet er bevaret ved skeletter. Den største art var sandsynligvis over 3,6 meter høj og vejede 230 kilogram. Moa betyder "spiselig fugl" (fjerkræ) på flere polynesiske sprog.

Elefantfuglen og de nulevende kiwi-fugle er begge i familie med moaen. De har alle traditionelt været klassificeret som strudsefugle, der bl.a. har det til fælles at de ikke kan flyve.

Moaer



Kæmpemoa (*Dinornis robustus*) i forgrunden

Bevaringsstatus



Uddød (IUCN 3.1)

Videnskabelig klassifikation

Rige	Animalia (Dyr)
Række	Chordata (Chordater)
Klasse	Aves (Fugle)
Orden	Struthioniformes (Strudsefugle)
Familie	Dinornithidae

Hjælp til læsning af taksobokse

Indholdsfortegnelse

Årsag til uddøen
Rygter om nulevende moaer
Fund i huler
Arter
Kæmpemoa
Andre arter
Billeder
Kilder/Eksterne henvisninger

Årsag til uddøen

Den sidste art levede på New Zealand indtil omkring 1530, hvor det sidste spor af moa kendes fra køkkenmøddinger. Der har dog været beretninger om fugle helt frem til 1800-tallet, men ingen af disse har senere kunnet bekræftes. Moaerne blev dels udryddet på grund af maoriernes jagt og dels på grund af færre egnede levesteder. Indtil omkring år 1000 havde New Zealand ikke kendt til pattedyr – heller ikke mennesker. Men omkring dette tidspunkt nåede maorierne til stedet fra Polynesien. Mange dyr i New Zealand var ikke tilpasset den jagt, der nu gik ind, både fra menneskene, men også fra de medbragte pattedyr.

Rygter om nulevende moaer

Der går ofte rygter om folk der har set levende moaer i New Zealand. Men som med den uddøde tasmanske pungulv i Australien, hvorom der også regelmæssigt bliver rapporteret, er det vist desværre meget usandsynligt, at så stort et dyr har kunnet skjule sig på trods af de mange uvejsomme skovområder på Sydøen.

Fund i huler

I dag kan man være heldig at finde moaskeletter i huler på Sydøen. Hulerne har huller eller svage punkter i loftet, hvor uheldige fugle er gået igennem og derefter ikke har kunnet finde ud igen.

Arter

Kæmpemoa

Hunnerne af de to største arter, Sydøens og Nordøens kæmpemoa (henholdsvis *Dinornis robustus* og *Dinornis novaezealandiae*), blev sandsynligvis over to meter høje og vejede omkring 250 kilo. Hannerne blev kun halvt så store. Til sammenligning var elefantfuglen fra Madagaskar en smule tungere og omtrent lige så høj.

Andre arter

Ud over de to arter af kæmpemoa, findes otte andre arter:

- Skovmoa, *Megalapteryx didinus*
- Elefantfods-moa, *Pachyornis elephantopus*
- Lille moa, *Emeus crassus*
- I øvrigt er følgende fem arter beskrevet: *Euryapteryx gravis*, *Euryapteryx curtus*, *Anomalopteryx didiformis*, *Pachyornis geranoides* og *Pachyornis australis*

Billeder

En rekonstruktion af en kæmpemoa, der står udstillet på Auckland Museum i New Zealand.



Sammenligning mellem kiwi, struds og moa.

Kilder/Eksterne henvisninger

- University of Adelaide (2012, August 3). Giant moa had climate change figured out. ScienceDaily (http://www.sciencedaily.com/releases/2012/08/120803114412.htm)
- Trevor H. Worthy. 'Moa', Te Ara - the Encyclopedia of New Zealand (http://www.TeAra.govt.nz/en/moa), opdateret 9-nov-12

Hentet fra "https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Moa&oldid=8598121"

Denne side blev senest ændret den 9. juni 2016 kl. 08:15.

Tekst er tilgængelig under Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0; yderligere betingelser kan være gældende. Se brugsbetingelserne for flere oplysninger.